



**Olimpiada Națională de Matematică**  
**Etapa Județeană și a Municipiului București, 12 Martie 2011**

**CLASA a X-a**

**Problema 1.** Fie  $a, b, c$  numere reale strict pozitive. Arătați că ecuația

$$a^x + b^x = c^x$$

are cel mult o soluție.

**Problema 2.** a) Arătați că, dacă  $z_1, z_2, z_3, z_4$  sunt numere complexe distincte, cu modulele egale și cu suma nulă, atunci patrulaterul cu vârfurile de afixe  $z_1, z_2, z_3, z_4$  este dreptunghi.

b) Arătați că, dacă numerele reale  $x, y, z, t$  îndeplinesc relațiile

$$\sin x + \sin y + \sin z + \sin t = 0 \text{ și } \cos x + \cos y + \cos z + \cos t = 0$$

atunci, pentru orice număr întreg  $n$ ,

$$\sin(2n + 1)x + \sin(2n + 1)y + \sin(2n + 1)z + \sin(2n + 1)t = 0.$$

**Problema 3.** Fie  $a, b$  două numere complexe. Arătați că următoarele afirmații sunt echivalente:

A<sub>1</sub>) Modulele rădăcinilor complexe ale ecuației  $x^2 - ax + b = 0$  sunt respectiv egale cu modulele rădăcinilor ecuației  $x^2 - bx + a = 0$ .

A<sub>2</sub>)  $a^3 = b^3$  sau  $b = \bar{a}$ .

**Problema 4.** a) Arătați că, dacă  $a, b > 1$  sunt numere reale distincte, atunci

$$\log_a(\log_a b) > \log_b(\log_a b).$$

b) Arătați că, dacă  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 2$  și  $a_1 > a_2 > \dots > a_n > 1$  sunt numere reale, atunci

$$\log_{a_1}(\log_{a_1} a_2) + \log_{a_2}(\log_{a_2} a_3) + \dots + \log_{a_{n-1}}(\log_{a_{n-1}} a_n) + \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) > 0.$$

*Timp de lucru 3 ore. Se acordă în plus 30 de minute pentru întrebări.  
Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.*

**Olimpiada de matematică, etapa județeană și a municipiului București,  
12 Martie 2011**

**Barem de corectare, clasa a X-a**

**Problema 1.** Fie  $a, b, c$  numere reale strict pozitive. Arătați că ecuația  $a^x + b^x = c^x$  are cel mult o soluție.

*Gazeta Matematică*

*Soluție.* Ecuația se reduce la  $f(x) := \left(\frac{a}{c}\right)^x + \left(\frac{b}{c}\right)^x = 1$ . **2p**

Dacă una dintre fracțiile precedente este  $\geq 1$  și cealaltă este  $\leq 1$ , atunci ecuația nu are nici soluții pozitive, nici soluții negative. **2p**

Dacă  $a > c$  și  $b > c$ , sau dacă  $a < c$  și  $b < c$ , atunci funcția  $f$  este strict monotonă, deci ecuația  $f(x) = 1$  are cel mult o soluție. **3p**

**Problema 2.** a) Arătați că, dacă  $z_1, z_2, z_3, z_4$  sunt numere complexe distincte, cu modulele egale și cu suma nulă, atunci patrulaterul cu vârfurile de afixe  $z_1, z_2, z_3, z_4$  este dreptunghi.

b) Arătați că, dacă numerele reale  $x, y, z, t$  îndeplinesc relațiile  $\sin x + \sin y + \sin z + \sin t = 0$  și  $\cos x + \cos y + \cos z + \cos t = 0$ , atunci pentru orice număr întreg  $n$ ,

$$\sin(2n+1)x + \sin(2n+1)y + \sin(2n+1)z + \sin(2n+1)t = 0.$$

*Soluție.* a) Din ipoteză,  $\sum \bar{z}_i = 0$  și numerele nu sunt nule, deci  $\sum \frac{1}{z_1} = 0$  (1). **2p**

Dacă  $z_1 + z_2 \neq 0$ , ipoteza și relația (1) duc la  $z_1 + z_2 = -z_3 + z_4$  și  $z_1 z_2 = z_3 z_4$ , ceea ce implică  $\{z_1, z_2\} = \{-z_3, -z_4\}$ , iar dacă  $z_1 + z_2 = 0$ , atunci  $z_3 + z_4 = 0$ ; în ambele cazuri, numerele  $z_1, z_2, z_3, z_4$  sunt două câte două opuse, de unde concluzia. **2p**

b) Dacă  $z_1 = \cos x + i \sin x$  și analoagele, atunci  $\sum z_i = 0$ . **1p**

De asemenea,  $|z_1| = |z_2| = |z_3| = |z_4| = 1$ . **1p**

Din a),  $z_1, z_2, z_3, z_4$  sunt opuse două câte două, de unde reiese imediat cerința. **1p**

**Problema 3.** Fie  $a, b$  două numere complexe. Arătați că următoarele afirmații sunt echivalente:

A<sub>1</sub>) Modulele rădăcinilor complexe ale ecuației  $x^2 - ax + b = 0$  sunt respectiv egale cu modulele rădăcinilor ecuației  $x^2 - bx + a = 0$ .

A<sub>2</sub>)  $a^3 = b^3$  sau  $b = \bar{a}$ .

*Soluție.* Dacă  $|x_1| = |x_3|, |x_2| = |x_4|$  (1), atunci  $|a| = |x_3 x_4| = |x_1 x_2| = |b|$ . **1p**

Deducem  $|x_1 + x_2| = |x_3 + x_4|$  (2). Din (1) și (2) reiese că există  $k \in \mathbb{C}$  astfel încât  $x_2 = kx_1, x_4 = \bar{k}x_3$ . **2p**

În primul caz avem  $a = kx_3^2 = (1+k)x_1$  și  $b = kx_1^2 = (1+k)x_3$ , ceea ce implică  $a^3 = k(1+k)^2 x_1^2 x_3^2 = b^3$ . **1p**

În al doilea caz avem  $a = \bar{k}x_3^2 = (1+\bar{k})x_1$  și  $b = kx_1^2 = (1+\bar{k})x_3$ , de unde  $x_1^2 \bar{x}_1 = x_3 \bar{x}_3^2$ , deci  $x_1 = \bar{x}_3$  sau  $a = b = 0$ , apoi  $x_2 = \bar{x}_4$ , deci  $a = \bar{b}$ . **1p**

Reciproc, dacă  $b = \bar{a}$ , atunci  $x_1 + x_2 = \bar{x}_3 + \bar{x}_4, x_1 x_2 = \bar{x}_3 \bar{x}_4$ , ceea ce arată că  $\{x_1, x_2\} = \{\bar{x}_3, \bar{x}_4\}$ , iar dacă  $a^3 = b^3$ , atunci  $a = \varepsilon b, \varepsilon^3 = 1$  și rădăcinile verifică relațiile  $x_1 + x_2 = \varepsilon(x_3 + x_4), x_1 x_2 = \varepsilon^2 x_3 x_4$ ; în ambele cazuri,  $\{|x_1|, |x_2|\} = \{|x_3|, |x_4|\}$ . **2p**

**Problema 4.** a) Arătați că, dacă  $a, b > 1$  sunt numere reale distincte, atunci

$$\log_a(\log_a b) > \log_b(\log_a b).$$

b) Arătați că, dacă  $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$  și  $a_1 > a_2 > \dots > a_n > 1$  sunt numere reale, atunci

$$\log_{a_1}(\log_{a_1} a_2) + \log_{a_2}(\log_{a_2} a_3) + \dots + \log_{a_{n-1}}(\log_{a_{n-1}} a_n) + \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) > 0.$$

*Soluție.* a) Dacă  $a < b$  atunci  $\log_a(\log_a b) = (\log_a b)(\log_b(\log_a b)) > \log_b(\log_a b)$  pentru că  $\log_b(\log_a b) > 0$  și  $\log_a b > 1$ . **2p**

Dacă  $a > b$ , atunci concluzia reiese din  $\log_b(\log_a b) < 0$  și  $\log_a b < 1$ . **2p**

b) Raționăm inductiv. Pentru  $n = 2$ ,

$$\log_{a_1}(\log_{a_1} a_2) + \log_{a_2}(\log_{a_2} a_1) > \log_{a_2}(\log_{a_1} a_2) + \log_{a_2}(\log_{a_2} a_1) = \log_{a_2} 1 = 0. \quad \mathbf{1p}$$

Pentru pasul de inducție: dacă  $a_1 > a_2 > \dots > a_{n+1} > 1$ , atunci

$$\begin{aligned} & \log_{a_1}(\log_{a_1} a_2) + \log_{a_2}(\log_{a_2} a_3) + \dots + \log_{a_n}(\log_{a_n} a_{n+1}) + \log_{a_{n+1}}(\log_{a_{n+1}} a_1) = \\ & = \log_{a_1}(\log_{a_1} a_2) + \dots + \log_{a_{n-1}}(\log_{a_{n-1}} a_n) + \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) + \log_{a_n}(\log_{a_n} a_{n+1}) + \\ & \quad + \log_{a_{n+1}}(\log_{a_{n+1}} a_1) - \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) > \\ & > \log_{a_{n+1}}(\log_{a_n} a_{n+1}) + \log_{a_{n+1}}(\log_{a_{n+1}} a_1) - \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) = \\ & = \log_{a_{n+1}}(\log_{a_n} a_1) - \log_{a_n}(\log_{a_n} a_1) > 0, \end{aligned}$$

deoarece  $\log_{a_n} a_1 > 0$  și  $a_{n+1} < a_n$ .

**2p**