

limpiada Națională de Matematică

Etapa locală - 15.02.2014

Clasa a XI-a M_1

Problema 1

Se consideră determinantul $f(x) = \begin{vmatrix} e^{2x^2} & e^{-a} & e^{-x} \\ e^{-a} & e^{2x} & e^{-x^2} \\ e^{-x} & e^{-x^2} & e^{2a} \end{vmatrix}$, unde $a \in \mathbb{R}$.

- Pentru ce valori ale lui $a \in \mathbb{R}$, ecuația $f(x) = 0$ are soluții reale?
- Să se determine $a \in \mathbb{R}$ pentru care ecuația $f(x) = 0$ are toate soluțiile numere reale strict negative.

Problema 2

Fie $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$ și $A, B \in M_n(\mathbb{Q})$ două matrice cu proprietatea că $A + B = AB$. Arătați că pentru orice $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$, proprietățile următoare sunt echivalente:

- $A + B + B^2 + \dots + B^{k-1} = O_n$.
- $B^k = O_n$.

Problema 3

Să se determine $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^4 + k}} \right)^{n^2 + 1}$.

Problema 4

Să se determine în funcție de $\alpha \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha (\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x} + \sqrt{x-1})$.

Notă

- Timp de lucru efectiv 3 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Pentru fiecare problemă rezolvată corect se acordă 7 puncte.

Olimpiada Națională de Matematică**Etapa locală - 15.02.2014****Clasa a XI-a M₂****Problema 1**

Se consideră funcția $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$. Să se determine domeniul maxim de definiție și asimptotele la graficul funcției.

Problema 2

Să se determine $x \in \mathbb{R}$ pentru care $\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x \\ 2 & x & 1 \end{vmatrix} = 0$.

Problema 3

Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{\operatorname{tg}(x^3 - 1)} \cdot \frac{e^{x^2 - 1} - 1}{x^4 - 1}$.

Problema 4

Fie matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$.

- Să se calculeze $\det(A + 3I_3)$.
- Să se verifice dacă $A^5 + 4A = O_3$.
- Să se calculeze $A + A^5 + A^9 + \dots + A^{2013}$.

Notă

- Timp de lucru efectiv 3 ore.
- Toate subiectele sunt obligatorii.
- Pentru fiecare problemă rezolvată corect se acordă 7 puncte.

Olimpiada Națională de Matematică
Etapa locală - 15.02.2014
Clasa a XI-a M₁

Soluții și bareme

1. a) Dezvoltând determinantul obținem: $f(x) = e^{2x^2+2x+2a} + 2e^{-x^2-x-a} - 3 = e^{2(x^2+x+a)} + \frac{2}{e^{(x^2+x+a)}} - 3$ 2p

Notând: $e^{(x^2+x+a)} = t > 0$, ecuația $f(x) = 0$ devine:

$$t^2 + \frac{2}{t} - 3 = 0 \Leftrightarrow \frac{t^3 - 3t + 2}{t} = 0 \Leftrightarrow \frac{(t-1)^2(t+2)}{t} = 0 \Leftrightarrow (t-1)^2(t+2) = 0 \Rightarrow t_1 = 1 > 0; t_2 = -2 < 0$$
1p

Revenind la notație, vom avea: $e^{(x^2+x+a)} = 1 \Rightarrow x^2 + x + a = 0 (*)$.

Ecuația are soluții reale $\Leftrightarrow \Delta \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 4a \geq 0 \Leftrightarrow a \in \left(-\infty, \frac{1}{4}\right]$1p

a) Ecuația $f(x) = 0$ are toate soluțiile strict negative \Leftrightarrow ecuația (*) are soluțiile x_1, x_2 strict negative.....1p

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ S < 0 \text{ unde } S = x_1 + x_2 = -1; P = x_1 \cdot x_2 = a \\ P > 0 \end{cases} \Rightarrow$$
1p

$$\begin{cases} a \in \left(-\infty, \frac{1}{4}\right] \\ -1 < 0 \text{ adevărat} \Leftrightarrow a \in \left(0, \frac{1}{4}\right] \\ a \in (0, \infty) \end{cases}$$
1p

2. 1) \Rightarrow 2) $A+B+B^2+\dots+B^{k-1} = O_n \mid \cdot B \Rightarrow AB+B^2+\dots+B^{k-1}+B^k = O_n \Rightarrow \underbrace{A+B+B^2+\dots+B^{k-1}}_{O_n} + B^k = O_n \Rightarrow B^k = O_n$ 3p

2) \Rightarrow 1) tim că $B^k = O_n, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Demonstrăm prin metoda inducției matematice afirmația de la (1)1p

$P(k): A+B+B^2+\dots+B^{k-1} = O_n, \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 2$

1) $P(2): A+B = O_n$ de verificat

$O_n = B^2 = AB^2 = (AB)B \stackrel{AB=A+B}{=} (A+B)B = AB+B^2 \stackrel{B^2=O_n}{=} AB = A+B \Rightarrow A+B = O_n \Rightarrow P(2)$ adev. rat.1p

$$II) P(k) \rightarrow P(k+1)$$

$P(k): A + B + B^2 + \dots + B^{k-1} = O_n$, pentru $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$ fixat, ipoteză de inducție

$P(k+1): A + B + B^2 + \dots + B^{k-1} + B^k = O_n$, trebuie demonstrat

Din $P(k) \Rightarrow A + B + \dots + B^{k-1} = O_n \mid + B^k (= O_n) \Rightarrow A + B + B^2 + \dots + B^{k-1} + B^k = O_n \Rightarrow P(k+1): A + B + B^2 + \dots + B^{k-1} + B^k = O_n$ adev. rat.2p

$$3. \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^4 + k} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 1}{k(k^3 + 1)} = \sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 1}{k(k+1)(k^2 - k + 1)} = \dots 2p$$

$$= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \dots 2p$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{\sum_{k=1}^n \frac{k^2 - k + 1}{k^4 + k}} \right)^{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{\frac{n}{n+1}} \right)^{n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{\frac{n^2+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{-1}{n+1} \right)^{\frac{n+1}{-1}} \right]^{\frac{-(n^2+1)}{n(n+1)}} = e^{-1} = \frac{1}{e} \dots 3p$$

$$4. \lim_{x \rightarrow \infty} x^r (\sqrt{x+1} - 2\sqrt{x} + \sqrt{x-1}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^r (\sqrt{x+1} - \sqrt{x} - \sqrt{x} + \sqrt{x-1}) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^r \left(\frac{\cancel{x}+1-\cancel{x}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} + \frac{\cancel{x}-1-\cancel{x}}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}} \right) = \dots 2p$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x^r \left(\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} + \frac{-1}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^r \left(\frac{\sqrt{x-1} + \cancel{\sqrt{x}} - \sqrt{x+1} - \cancel{\sqrt{x}}}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x})} \right) = \dots 1p$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x^r \left(\frac{\cancel{x}-1-\cancel{x}-1}{(\sqrt{x+1}+\sqrt{x})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x})(\sqrt{x-1}+\sqrt{x+1})} \right) = \dots 1p$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^r}{x^2 \left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1 \right) \left(\sqrt{1-\frac{1}{x}}+1 \right) \left(\sqrt{1-\frac{1}{x}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}} \right)} \stackrel{not}{=} l \dots 2p$$

Discuție:

1) Pentru $r < \frac{3}{2} \Rightarrow l = 0$ 2) Pentru $r = \frac{3}{2} \Rightarrow l = -\frac{1}{4}$ 3) Pentru $r > \frac{3}{2} \Rightarrow l = -\infty$ 1p

Olimpiada Națională de Matematică

Etapa locală - 15.02.2014

Clasa a XI-a M₂

Soluții și bareme

1. $D = \mathbb{R} \Rightarrow$ nu există asimptote verticale. Cum $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty \Rightarrow$ nu există asimptote orizontale.2p

Studiem existența asimptotei oblice la $-\infty$:

$$m = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{x} = -1, \quad \dots\dots 1p$$

$$n = \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\underbrace{\sqrt{x^2 + 2}}_{\infty} + \underbrace{x}_{-\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^{\cancel{2}} + 2 - x^{\cancel{2}}}{\sqrt{x^2 + 2} - x} = \frac{2}{\infty} = 0, \quad \dots\dots 1p$$

deci $y = -x$ asimptot oblic la $-\infty$0,5p

Studiem existența asimptotei oblice la $+\infty$:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}}}{x} = 1, \quad \dots\dots 1p$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\underbrace{\sqrt{x^2 + 2}}_{\infty} - \underbrace{x}_{\infty} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\cancel{2}} + 2 - x^{\cancel{2}}}{\sqrt{x^2 + 2} + x} = \frac{2}{\infty} = 0, \quad \dots\dots 1p$$

deci $y = x$ asimptot oblic la $+\infty$0,5p

$$2. \begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x \\ 2 & x & 1 \end{vmatrix} \stackrel{L_1 \rightarrow L_1 + L_2 + L_3}{=} \begin{vmatrix} x+3 & x+3 & x+3 \\ 1 & 2 & x \\ 2 & x & 1 \end{vmatrix} = (x+3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & x \\ 2 & x & 1 \end{vmatrix} = (x+3) \cdot (2+x+2x-4-x^2-1) = (x+3) \cdot (-x^2+3x-3) \quad \dots\dots 4p$$

Cum determinantul este nul $\Leftrightarrow (x+3) \cdot (-x^2+3x-3) = 0$, adică $x+3=0 \Leftrightarrow x=-3$ 1p

sau $-x^2+3x-3=0$, dar $\Delta = -3 < 0$ și ecuația nu are soluții reale. Deci $S = \{-3\}$2p

$$3. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{\operatorname{tg}(x^3 - 1)} \cdot \frac{e^{x^2 - 1}}{x^4 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\overbrace{\frac{\sin(x^2 - 1)}{x^2 - 1}}^{\nearrow 1} \cdot \cancel{(x-1)}(x+1)}{\underbrace{\frac{\operatorname{tg}(x^3 - 1)}{x^3 - 1}}^{\searrow 1} \cdot \cancel{(x-1)}(x^2 + x + 1)} \cdot \frac{\overbrace{\frac{e^{x^2 - 1} - 1}{x^2 - 1}}^{\nearrow 1} \cdot \cancel{(x^2 - 1)}}{(x^2 - 1)(x^2 + 1)} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}. \quad \dots\dots 7p$$

$$4. \text{ a) } \det(A + 3I_3) = \begin{vmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 48 + 3 = 51. \quad \dots\dots 2p$$

$$\text{b) } A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}, A^5 = A^3 \cdot A^2 = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \dots\dots 1p$$

$$A^5 + 4A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3. \quad \dots\dots 1p$$

$$\text{c) Din (b) } \Rightarrow A^5 + 4A = O_3 \Rightarrow A^5 = -4A, A^9 = A^5 \cdot A^4 = -4A^5 = (-4)^2 A, A^{13} = A^9 \cdot A^4 = (-4)^2 A^5 = (-4)^3 A, \dots, A^{2013} = (-4)^{503} A, \Rightarrow \dots\dots 1p$$

$$A + A^5 + A^9 + \dots + A^{2013} = A + (-4)A + (-4)^2 A + \dots + (-4)^{503} A = [1 + (-4) + (-4)^2 + \dots + (-4)^{503}] A = \dots\dots 1p$$

$$= \frac{(-4)^{504} - 1}{-4 - 1} A = \frac{1 - 4^{504}}{5} A. \quad \dots\dots 1p$$