

Clasa a XI-a — Soluții și barem orientativ

Problema 1. Dacă n este un număr natural, iterata de ordin n a unei funcții $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ este funcția

$$f^n = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_n;$$

unde f^0 este identitatea. Determinați funcțiile continue $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

- (a) Funcția $f^0 + f^1$ este crescătoare; și
- (b) Există un număr natural nenul m , astfel încât funcția $f^0 + \cdots + f^m$ este descrescătoare.

Soluție. Funcțiile cerute sunt de forma $f(x) = -x + c$, unde c este o constantă reală. Aceste funcții verifică în mod evident condițiile din enunț.

Arătăm mai întâi că f este injectivă. Fie x și y două numere reale, astfel încât $f(x) = f(y)$, și fie $g_n = f^0 + \cdots + f^n$, $n \in \mathbb{N}$. Întrucât g_1 este crescătoare, g_m este descrescătoare, iar $g_1(x) - g_1(y) = x - y = g_m(x) - g_m(y)$, rezultă că $(x - y)^2 = (g_1(x) - g_1(y))(g_m(x) - g_m(y)) \leq 0$, deci $x = y$.

..... 2 puncte

Întrucât f este injectivă și continuă (proprietatea valorii intermediare (Darboux) este suficientă), f este strict monotonă, deci toate iteratele sale de ordin par, f^{2k} , sunt strict crescătoare.

..... 1 punct

Funcția g_1 fiind crescătoare, din paragraful precedent și relația

$$g_n = \begin{cases} \sum_{k=0}^{n/2-1} g_1 \circ f^{2k} + f^n, & \text{dacă } n \text{ este par,} \\ \sum_{k=0}^{(n-1)/2} g_1 \circ f^{2k}, & \text{dacă } n \text{ este impar,} \end{cases}$$

rezultă că g_n este strict crescătoare, dacă n este par, și crescătoare, dacă n este impar.

..... 2 puncte

Funcția g_m fiind descrescătoare, rezultă că m este impar și g_m constantă. În fine, g_1 fiind crescătoare și toate iteratele de ordin par ale lui f fiind (strict) crescătoare, deducem că g_1 este constantă, de unde rezultă concluzia.

..... 2 puncte

Problema 2. Determinați funcțiile derivabile $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, care îndeplinesc condiția $f \circ f = f$.

Soluție. Funcțiile cerute sunt funcțiile constante și identitatea, funcții care verifică în mod evident condițiile din enunț.

Întrucât f este continuă, imaginea sa, $\{f(x): x \in \mathbb{R}\}$, este un interval $I \subseteq \mathbb{R}$. Dacă I este un singleton, atunci f este constantă.

..... 1 punct

Dacă I este nedegenerat, fie $a = \inf I < \sup I = b$, unde $a, b \in \mathbb{R}$. Din condiția din enunț rezultă că restricția lui f la intervalul deschis (a, b) este identitatea:

$$f(x) = x, \quad a < x < b. \tag{1}$$

..... 1 punct

Vom arăta că $a = -\infty$ și $b = +\infty$, i.e., $I = \mathbb{R}$ și f este identitatea. Să presupunem că a este real. Continuitatea lui f în a și (1) implică $f(a) = a$, deci

$$f'(a) = f'_d(a) = \lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a, x > a} \frac{x - a}{x - a} = 1. \quad (2)$$

Pe de altă parte, f are un minimum în a , deoarece $f(a) = a = \inf I = \inf \{f(x) : x \in \mathbb{R}\}$, deci, conform teoremei lui Fermat, $f'(a) = 0$, în contradicție cu (2). Prin urmare, $a = -\infty$. În mod analog, $b = +\infty$.

..... 5 puncte

Problema 3. Fie n un număr natural nenul și A, B două matrice din $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, astfel încât $A^2 + B^2 = 2AB$. Arătați că:

- (a) Matricea $AB - BA$ este singulară; și
- (b) Dacă rangul matricei $A - B$ este 1, atunci matricele A și B comută.

Soluție. (a) Relația din enunț este echivalentă cu fiecare dintre următoarele două relații:

$$(A - B)^2 = AB - BA, \quad (1)$$

$$A(A - B) = (A - B)B. \quad (2)$$

Să presupunem că matricea $AB - BA$ este nesingulară. Conform (1), și $A - B$ este nesingulară, deci $B = (A - B)^{-1}A(A - B)$, conform (2). Așadar, $A - B = A - (A - B)^{-1}A(A - B)$, de unde, $I_n = A(A - B)^{-1} - (A - B)^{-1}A$. Trecând la urmă, obținem o contradicție: $n = \text{tr } I_n = \text{tr}(A(A - B)^{-1} - (A - B)^{-1}A) = 0$. Prin urmare, matricea $AB - BA$ este singulară; în plus, din relația (1) rezultă că și matricea $A - B$ este singulară.

..... 4 puncte

(b) Reamintim că, dacă X este o matrice de rang 1 din $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, atunci $X^2 = (\text{tr } X)X$ — aceasta rezultă din faptul că fiecare linie a lui X este proporțională cu o linie nenulă a lui X .

Conform relației (1) și rezultatului amintit mai sus,

$$AB - BA = (A - B)^2 = (\text{tr}(A - B))(A - B),$$

deci $0 = \text{tr}(AB - BA) = (\text{tr}(A - B))^2$, i.e., $\text{tr}(A - B) = 0$. Prin urmare, $AB - BA = O_n$, i.e., $AB = BA$.

..... 3 puncte

Problema 4. Fie A o matrice inversabilă din $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, astfel încât $\text{tr } A = \text{tr } A^* \neq 0$, unde A^* este adjuncta matricei A . Arătați că matricea $A^2 + I_4$ este singulară dacă și numai dacă există o matrice nenulă B în $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, astfel încât $AB = -BA$.

Soluție. Arătăm mai întâi că, dacă A este o matrice din $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, astfel încât $A^2 + I_n$ este singulară, atunci există o matrice nenulă B în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, astfel încât $AB = -BA$.

Întrucât $A^2 + I_n$ este singulară, i este o valoare proprie a lui A , iar $-i$ este o valoare proprie a transpusui A^τ . Există deci doi vectori nenuli \mathbf{x} și \mathbf{y} în $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C})$, astfel încât $A\mathbf{x} = i\mathbf{x}$ și $A^\tau\mathbf{y} = -i\mathbf{y}$. Întrucât \mathbf{x} și \mathbf{y} sunt nenuli, $B = \mathbf{x}\mathbf{y}^\tau$ este o matrice nenulă din $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Matricele A și B anticomută:

$$AB = A\mathbf{x}\mathbf{y}^\tau = \mathbf{i}\mathbf{x}\mathbf{y}^\tau = -\mathbf{x}(-\mathbf{i}\mathbf{y})^\tau = -\mathbf{x}(A^\tau\mathbf{y})^\tau = -\mathbf{x}\mathbf{y}^\tau A = -BA.$$

Trecând la conjugate și ținând cont de faptul că A este în $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, rezultă că și conjugata \bar{B} a lui B anticomută cu A . Deci orice combinație liniară cu coeficienți complecși a matricelor B și \bar{B} anticomută cu A . Prin urmare, B sau $i(B - \bar{B})$ este o matrice nenulă din $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, care anticomută cu A . În particular, am demonstrat una dintre implicațiile problemei.

..... **4 puncte**

Arătăm acum că, în condițiile din enunț, este adevărată și reciprocă. Fie B o matrice nenulă din $\mathcal{M}_4(\mathbb{R})$, care anticomută cu A . Atunci

$$A^k B = (-1)^k B A^k, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

Considerăm polinomul caracteristic f al matricei A ,

$$f = \lambda^4 - (\text{tr } A)\lambda^3 + a\lambda^2 - (\text{tr } A^*)\lambda + \det A = \lambda^4 - (\text{tr } A)\lambda^3 + a\lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A,$$

unde a este un număr real; cea de a doua expresie a lui f rezultă din ipoteza $\text{tr } A = \text{tr } A^*$.

Conform teoremei Hamilton-Cayley, $f(A) = O_4$. Ținând cont de $(*)$, obținem succesiv:

$$\begin{aligned} O_4 &= f(A)B = B(A^4 + (\text{tr } A)A^3 + aA^2 + (\text{tr } A)A + (\det A)I_4) \\ &= B(f(A) + 2(\text{tr } A)(A^2 + I_4)A) = 2(\text{tr } A)B(A^2 + I_4)A. \end{aligned}$$

Întrucât $\text{tr } A \neq 0$, iar A este inversabilă, rezultă că $B(A^2 + I_4) = O_4$. Matricea B fiind nenulă, conchidem că $A^2 + I_4$ este singulară.

..... **3 puncte**