



Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Finală, Târgu Mureș, 20 aprilie 2016
CLASA a VIII-a

Problema 1. Vârfurile unei prisme se colorează cu două culori astfel încât capetele fiecărei muchii laterale să fie colorate diferit. Se consideră toate segmentele care unesc câte două vârfuri ale prisme, altele decât muchiile laterale. Arătați că numărul segmentelor cu capetele colorate diferit coincide cu numărul segmentelor cu capetele colorate la fel.

Problema 2. Într-un cub $ABCD A' B' C' D'$ se consideră două puncte $M \in (CD')$ și $N \in (DA')$. Arătați că MN este perpendiculara comună a dreptelor CD' și DA' dacă și numai dacă $\frac{D'M}{D'C} = \frac{DN}{DA'} = \frac{1}{3}$.

Problema 3. Dacă a , b și c sunt lungimile laturilor unui triunghi, arătați că

$$\frac{3}{2} \leq \frac{b+c}{b+c+2a} + \frac{a+c}{a+c+2b} + \frac{a+b}{a+b+2c} < \frac{5}{3}.$$

Problema 4. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$ spunem că numerele naturale x_1, x_2, \dots, x_n au proprietatea (\mathcal{P}) , dacă

$$x_1 x_2 \cdots x_n = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n.$$

a) Arătați că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ există n numere naturale nenule cu proprietatea (\mathcal{P}) .

b) Determinați numerele naturale $n \geq 2$ pentru care există n numere naturale x_1, x_2, \dots, x_n , cu $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n$, care au proprietatea (\mathcal{P}) .

Timp de lucru 4 ore.

Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.

Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Finală, Târgu Mureș, 20 aprilie 2016


CLASA a VIII-a - Soluții și bareme orientative

Problema 1. Vârfurile unei prisme se colorează cu două culori astfel încât capetele fiecărei muchii laterale să fie colorate diferit. Se consideră toate segmentele care unesc câte două vârfuri ale prisme, altele decât muchiile laterale. Arătați că numărul segmentelor cu capetele colorate diferit coincide cu numărul segmentelor cu capetele colorate la fel.

Soluție. Fie n numărul de laturi ale unei baze a prisme. Atunci numărul de segmente luate în considerare este $\frac{2n(2n-1)}{2} - n = 2(n^2 - n)$ **1p**
Fie a numărul vârfurilor bazei superioare colorate cu prima culoare, iar $b = n - a$ numărul vârfurilor bazei superioare colorate cu a doua culoare. Pe baza inferioară vor fi atunci b puncte colorate cu prima culoare și a puncte colorate cu a doua culoare. **1p**
Numărul segmentelor cu capetele diferit colorate și pe baze diferite este $a^2 + b^2 - n$.
Numărul segmentelor cu capetele diferit colorate aflate pe o aceeași bază este $2ab$.
Numărul total de segmente cu capetele colorate diferit este atunci $(a + b)^2 - n = n^2 - n$ **3p**
Numărul segmentelor cu capetele colorate la fel este atunci $2(n^2 - n) - (n^2 - n) = n^2 - n$ și este egal cu cel al segmentelor cu capetele colorate diferit. **2p**

Problema 2. Într-un cub $ABCD A' B' C' D'$ se consideră două puncte $M \in (CD')$ și $N \in (DA')$. Arătați că MN este perpendiculara comună a dreptelor CD' și DA' dacă și numai dacă $\frac{D'M}{D'C} = \frac{DN}{DA'} = \frac{1}{3}$.

Soluție.



Dacă $\frac{D'M}{D'C} = \frac{DN}{DA'} = \frac{1}{3}$, atunci M și N sunt centrele de greutate ale triunghiurilor $DD'C$ și, respectiv, ADD' , deci punctele C', M, P și A, N, P sunt coliniare, unde P este mijlocul muchiei DD' **2p**

În triunghiul APC' avem $\frac{PM}{PC'} = \frac{PN}{PA}$, deci $MN \parallel AC'$. Iar $AC' \perp D'C$ și $AC' \perp A'D$ ($(AC'D)$ este planul mediator al segmentului $D'C$, iar $(AD'C')$ este planul mediator al segmentului $A'D$.) Deci MN este perpendiculara comună a dreptelor CD' și DA' **3p**

Reciproc, dacă MN este perpendiculara comună a celor două drepte, acesta fiind unică, este cea din punctul anterior, deci $\frac{D'M}{D'C} = \frac{DN}{DA'} = \frac{1}{3}$ **2p**

Problema 3. Dacă a, b și c sunt lungimile laturilor unui triunghi, arătați că

$$\frac{3}{2} \leq \frac{b+c}{b+c+2a} + \frac{a+c}{a+c+2b} + \frac{a+b}{a+b+2c} < \frac{5}{3}.$$

Soluție.

Inegalitatea $\frac{3}{2} \leq \frac{b+c}{b+c+2a} + \frac{a+c}{a+c+2b} + \frac{a+b}{a+b+2c}$ este inegalitatea Nesbitt pentru tripletul de numere pozitive $(b+c, a+c, a+b)$ **2p**
Din inegalitatea triunghiului avem

$$b + c > a \Leftrightarrow 3a + 3b + 3c > 4a + 2b + 2c \Leftrightarrow \frac{2}{3(a+b+c)} < \frac{1}{2a+b+c} \Leftrightarrow \frac{4a}{3(a+b+c)} < \frac{2a}{2a+b+c} \Leftrightarrow \frac{4a}{3(a+b+c)} < 1 - \frac{b+c}{2a+b+c} \dots\dots\dots \mathbf{3p}$$

Analog se arată că $\frac{4b}{3(a+b+c)} < 1 - \frac{a+c}{2b+a+c}$ și $\frac{4c}{3(a+b+c)} < 1 - \frac{a+b}{2c+a+b}$. Adunând ultimele trei inegalități obținem $\frac{4}{3} < 3 - \left(\frac{b+c}{b+c+2a} + \frac{a+c}{a+c+2b} + \frac{a+b}{a+b+2c} \right)$ echivalentă cu inegalitatea de demonstrat. $\mathbf{2p}$

Problema 4. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$ spunem că numerele naturale x_1, x_2, \dots, x_n au proprietatea (P), dacă

$$x_1 x_2 \cdots x_n = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + \cdots + nx_n. \quad (1)$$

a) Arătați că pentru orice $n \in \mathbb{N}^*$ există n numere naturale nenule cu proprietatea (P).

b) Determinați numerele naturale $n \geq 2$ pentru care există n numere naturale x_1, x_2, \dots, x_n , cu $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_n$, care au proprietatea (P).

Soluție. a) Pentru $n = 1$ orice număr natural x_1 verifică proprietatea (P).

Pentru $n = 2$ egalitatea (1) este echivalentă cu $(x_1 - 2)(x_2 - 1) = 2$ și perechile (x_1, x_2) de numere naturale nenule care au proprietatea (P) sunt $(3, 3)$ și $(4, 2)$.

Pentru $n \geq 3$, alegând $x_1 = x_2 = \cdots = x_{n-2} = 1$, egalitatea (1) se reduce la $(x_{n-1} - n)(x_n - (n - 1)) = n(n - 1) + \frac{(n-2)(n-1)}{2}$ și este verificată de numerele $x_{n-1} = n + 1$ și $x_n = n - 1 + n(n - 1) + \frac{(n-2)(n-1)}{2} = \frac{3n(n-1)}{2}$ $\mathbf{2p}$

b) Evident, $x_1 \neq 0$, deoarece altfel $x_1 x_2 \dots x_n = 0 < 0 + 2x_2 + \cdots + nx_n = x_1 + 2x_2 + \cdots + nx_n$.

Împărțind egalitatea (1) prin $x_1 x_2 \dots x_n$, aceasta devine

$$1 = \frac{1}{x_2 x_3 \dots x_n} + \frac{2}{x_1 x_3 \dots x_n} + \frac{3}{x_1 x_2 x_4 \dots x_n} + \cdots + \frac{n}{x_1 x_2 \dots x_{n-1}}.$$

Deoarece $x_2 x_3 \dots x_n > x_1 x_3 \dots x_n > \cdots > x_1 x_2 \dots x_{n-1} \geq (n - 1)!$, rezultă că

$$1 < \frac{1 + 2 + \cdots + n}{(n - 1)!} = \frac{n(n + 1)}{2(n - 1)!}$$

Pentru $2 \leq n \leq 4$, inegalitatea de mai sus are loc.

Pentru $n \geq 5$, scriind $n(n + 1) = (n - 1)(n - 2) + 4(n - 1) + 2$, aceasta devine

$$\begin{aligned} 1 &< \frac{n(n + 1)}{2(n - 1)!} = \frac{(n - 1)(n - 2) + 4(n - 1) + 2}{2(n - 1)!} = \frac{1}{2(n - 3)!} + \frac{2}{(n - 2)!} + \frac{1}{(n - 1)!} \leq \\ &\leq \frac{1}{2 \cdot 2!} + \frac{2}{3!} + \frac{1}{4!} = \frac{1}{4} + \frac{2}{6} + \frac{1}{24} = \frac{5}{8} < 1. \end{aligned}$$

Rezultă că $n \in \{2, 3, 4\}$ $\mathbf{3p}$

Pentru $n = 2$ am văzut că perechile (x_1, x_2) de numere naturale nenule care au proprietatea (P) sunt $(3, 3)$ și $(4, 2)$. Prin urmare nu există perechi care să satisfacă și inegalitatea $x_1 < x_2$.

Pentru $n = 3$ putem alege $x_1 = 1$, $x_2 = 4$ și $x_3 = 9$ (ca în exemplul de la a)), care verifică inegalitatea $x_1 < x_2 < x_3$ și au proprietatea (P).

Pentru $n = 4$, alegând $x_1 = 1$ și $x = 2$, egalitatea (1) se reduce la $(2x_3 - 4)(2x_4 - 3) = 22$ și este verificată de $x_3 = 3$ și $x_4 = 7$.

Prin urmare numerele naturale $n \geq 2$ care satisfac condiția cerută sunt $n = 3$ și $n = 4$ $\mathbf{2p}$