

Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Județeană și a Municipiului București, 18 martie 2017
CLASA a VIII-a

Soluții și bareme orientative

Problema 1.

- a) Fie $m, n, p \in \mathbb{N}$, $m > n$, astfel încât $\sqrt{m} - \sqrt{n} = p$. Demonstrați că m și n sunt pătrate perfecte.
 b) Determinați numerele \overline{abcd} care verifică egalitatea

$$\sqrt{\overline{abcd}} - \sqrt{\overline{acd}} = \overline{bb}.$$


Soluție și barem.

- a) Avem $m = p^2 + 2p\sqrt{n} + n$, deci \sqrt{n} este rațional, ceea ce conduce la concluzia că n este pătrat perfect. Apoi obținem $\sqrt{m} \in \mathbb{N}$, deci și m este pătrat perfect. **2p**
 b) Conform punctului anterior, \overline{abcd} și \overline{acd} sunt pătrate perfecte. Deoarece $\overline{bb} \vdash 11$, deducem că $\overline{abcd} - \overline{acd} \vdash 11$, adică $100(\overline{ab} - a) \vdash 11$. Obținem $9a + b \vdash 11$ **2p**
 Atunci $(a; b) \in \{(1; 2), (2; 4), (3; 6), (4; 8), (6; 1), (7; 3); (8; 5); (9, 7)\}$. Analiza tuturor situațiilor conduce la concluzia $abcd = 1296$ **3p**

Problema 2. Fie $ABCDA'B'C'D'$ un cub de latură a . Notăm cu M și P mijloacele muchiilor $[AB]$, respectiv $[DD']$.

- a) Demonstrați că $MP \perp A'C$;
 b) Calculați distanța dintre dreptele MP și $A'C$.

Soluție și barem. Fie O mijlocul lui $[A'C]$.



- a) Deoarece triunghiul $MA'C$ este isoscel, rezultă $MO \perp A'C$ 1p
 Analog, triunghiul $PA'C$ este isoscel, deci $PO \perp A'C$. Atunci $A'C \perp (PMO)$, deci $A'C \perp MP$ 2p
 b) Fie S mijlocul lui $[MP]$. Triunghiurile $MA'C$ și $PA'C$ sunt congruente, deci $[PO] \equiv [MO]$. Atunci $OS \perp MP$, deci OS este distanța dintre dreptele MP și $A'C$ 2p
 Avem $MC = \frac{a\sqrt{5}}{2}$ deci $MO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$. Apoi $MP = \frac{a\sqrt{6}}{2}$. Din triunghiul dreptunghic OSM , obținem $OS = \frac{a\sqrt{2}}{4}$ 2p

Problema 3.

- a) Fie $x \in [1, \infty)$. Demonstrați că $x^3 - 5x^2 + 8x - 4 \geq 0$.
 b) Fie $a, b \in [1, \infty)$. Determinați minimul expresiei $ab(a+b-10) + 8(a+b)$.

Soluție și barem.

- a) Inegalitatea este echivalentă cu $(x-1)(x-2)^2 \geq 0$ 2p
 b) Vom demonstra că minimul căutat este 8. 1p
 Deoarece $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, avem $ab(a+b-10) + 8(a+b) \geq ab(2\sqrt{ab} - 10) + 16\sqrt{ab}$.

1p

Cu notația $\sqrt{ab} = x$, obținem egalitatea $ab(2\sqrt{ab} - 10) + 16\sqrt{ab} = 2x^3 - 10x^2 + 16x$.
 Dar $2x^3 - 10x^2 + 16x \geq 8$, conform punctului precedent. 1p
 Egalitatea se obține când $a = b = x \in \{1, 2\}$, adică pentru $a = b = 1$ și $a = b = 2$. 2p

Problema 4. Fie $ABCD A'B'C'D'$ un cub de latură 1. O furnică parcurge un drum pe fețele cubului, pornind din A și terminând în C' . Deplasarea se realizează doar pe muchiile cubului sau pe diagonalele fețelor sale. Știind că drumul nu trece prin niciun punct de două ori, determinați lungimea maximă a unui asemenea drum.


Soluție și barem.

Vom demonstra că lungimea maximă este $3 + 4\sqrt{2}$ 1p
 Un exemplu de traseu ar fi $A \rightarrow A' \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow D' \rightarrow C \rightarrow B' \rightarrow C'$, cu lungimea $3 + 4\sqrt{2}$ 1p
 Deoarece sunt 8 vârfuri, furnica poate face cel mult 7 pași, de lungime fie 1, fie $\sqrt{2}$. Un drum format din cel mult 6 pași are lungimea maximă $6\sqrt{2}$, care este mai mică decât $3 + 4\sqrt{2}$. Deci furnica trebuie să facă 7 pași. 1p

Vom demonstra că numărul maxim de pași diagonali este 4. Pentru aceasta colorăm vârfurile A, C, B', D' cu negru, iar celelalte cu alb.

Observăm că un pas diagonal păstrează culoarea, dar un pas pe muchii schimbă culoarea. Cum, punctele A și C' au culori diferite, deducem că furnica trebuie să parcurgă un număr impar de pași pe muchii, deci nu putem avea un drum cu 2 pași pe muchii și 5 pași diagonali. 2p

Un eventual traseu cu 6 pași diagonali ar conține câte un pas pe fiecare față. Având doar patru puncte de aceeași culoare, putem avea cel mult 3 pași diagonali consecutivi.



Primii 3 pași ar porni din A , și ar trece prin toate punctele negre. Ultimii pași ar trece prin toate punctele albe și ar încheia traseul în C' . Analizând pe cazuri, vom observa că drumul se va autointersecta. **2p**