



Olimpiada Națională de Matematică

Etapa Județeană și a Municipiului București, 10 Martie 2012

CLASA a V-a

Problema 1. Aflați numerele de trei cifre care se micșorează de nouă ori dacă li se șterge cifra din mijloc.

Gazeta Matematică

Problema 2.

- Care puteri ale numărului 2 se scriu cu patru cifre (în baza 10)?
- Fie n număr natural nenul. Arătați că există cel puțin trei puteri a lui 2 care se scriu cu n cifre (în baza 10).

Problema 3. Se consideră 51 de numere naturale pare. Demonstrați că putem alege două dintre acestea cu proprietatea că produsul dintre suma și diferența lor este divizibil cu 400.

Problema 4. Într-o cutie se află 36 de bile numerotate de la 1 la 36. Ion încearcă să elimine bilele din cutie, în etape. Fiecare etapă constă în următoarea succesiune de operații:

- Ion extrage la întâmplare patru bile din urnă.
- Ion elimină câte două bile dintre cele patru dacă diferența numerelor înscrise pe acestea se divide cu 3.
- Ion reintroduce în urnă bilele care nu au fost eliminate.

- Arătați că, în fiecare etapă, Ion poate elimina cel puțin două bile.
- Arătați că, dacă în cutie rămân numai patru bile, atunci Ion le poate elimina pe toate.

*Timp de lucru 2 ore. Se acordă în plus 30 de minute pentru întrebări.
Fiecare problemă este notată cu 7 puncte.*


Olimpiada Națională de Matematică
Etapa Județeană și a Municipiului București, 10 martie 2018

CLASA a V-a, varianta 2

Problema 1. Vlad, Luca și Adina au cumpărat de la o librărie rechizite în valoare totală de 118 lei. Vlad a cumpărat 5 pixuri, 4 caiete și 3 cutii cu creioane colorate, Luca a cumpărat 7 pixuri, 3 caiete și 4 cutii cu creioane colorate, iar Adina a cumpărat 8 pixuri, 7 caiete și 7 cutii cu creioane colorate.

Știind că Luca a plătit cu 5 lei mai mult decât Vlad, iar Adina cu 4 lei mai puțin decât Vlad și Luca la un loc, aflați cât costă un creion, cât costă un caiet și cât costă o cutie cu creioane colorate.

Soluție. Folosim metoda grafică pentru a afla sumele plătite de fiecare copil. În reprezentarea de mai jos, p este suma plătită de Vlad:



..... **1p**
 $p + p + 5 + 2p + 1 = 118$, de unde $p = 28$, deci Vlad a plătit 28 de lei, Luca a plătit 33 de lei, iar Adina 57 de lei **2p**

Folosim metoda comparației pentru a afla prețul fiecărui tip de rechizite:

5 pixuri	4 caiete	3 cutii cu creioane	28 lei
7 pixuri	3 caiete	4 cutii cu creioane	33 lei
8 pixuri	7 caiete	7 cutii cu creioane	57 lei

Adunând primele două relații obținem

12 pixuri	7 caiete	7 cutii cu creioane	61 lei
-----------------	----------------	---------------------------	--------

..... **1p**
 Comparând cu a treia relație și efectuând diferența, obținem că 4 pixuri costă 4 lei, deci un pix costă 1 leu **1p**

Înlocuind în primele două relații, obținem:

4 caiete	3 cutii cu creioane	23 lei
3 caiete	4 cutii cu creioane	26 lei

Pentru a aduce la același termen de comparație, vom egala numărul de caiete, înmulțind cu 3 prima relație și cu 4 pe cea de-a doua:

12 caiete	9 cutii cu creioane	69 lei
12 caiete	16 cutii cu creioane	104 lei

Obținem că 7 cutii cu creioane costă 35 de lei, deci o cutie cu creioane costă 5 lei **1p**

Înlocuind într-una dintre relații, obținem că un caiet costă 2 lei **1p**

Problema 2. Suma a 15 numere naturale consecutive este un număr cu cifre diferite, printre care se află cifrele 0, 1, 2 și 4. Care este cel mai mic număr posibil dintre cele 15 numere?

Soluție. Dacă n este cel mai mic număr căutat, atunci cele 15 numere consecutive din enunț sunt $n, n + 1, \dots, n + 14$, a căror sumă S este egală cu $15n + 105$, adică $S = 3 \cdot 5 \cdot (n + 7)$ **3p**

Întrucât suma S este divizibilă cu 3, suma cifrelor lui S este, la rândul ei, divizibilă cu 3. Cum 0, 1, 2 și 4 sunt cifre ale lui S , iar $0 + 1 + 2 + 4 = 7$ nu se divide cu 3, rezultă că S mai are cel puțin încă o cifră, diferită de 0, 1, 2 și 4. Condițiile de minim și de divizibilitate cu 3 conduc la faptul că S mai are o singură altă cifră, egală cu 5 **2p**

Cel mai mic număr de forma $15(n + 7)$ care se scrie cu cifrele 0, 1, 2, 4 și 5 este 10 245, pentru care se obține $n = 676$ **2p**

Problema 3. Determinați numerele de forma \overline{abcd} care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- suma pătratelor cifrelor este divizibilă cu 4;
- restul împărțirii numărului \overline{abcd} la c este 7.

Soluție. Pătratul unui număr natural este de forma $4k$ sau $4k + 1$ **1p**

$a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ este divizibil cu 4 dacă a, b, c, d au aceeași paritate **1p**

Din teorema împărțirii cu rest există numerele naturale q și r astfel încât $\overline{abcd} = c \cdot q + 7$ și $7 < c$, deci $c = 8$ sau $c = 9$ **1p**

Dacă $c = 8$, toate cifrele sunt pare și $\overline{abcd} = 8q + 7$, imposibil, deoarece membrul stâng este par, iar membrul drept este impar **1p**

Dacă $c = 9$, toate cifrele sunt impare și, cum $\overline{ab9d}$ dă restul 7 la împărțirea cu 9, rezultă că $a + b + d + 9$ este un număr par care dă restul 7 la împărțirea cu 9; se obține că $a + b + d$ poate fi 7 sau 25 **1p**

Pentru $a + b + d = 7$ se obțin soluțiile 1393, 3193, 3391, 1195, 1591 și 5191 **1p**

Pentru $a + b + d = 25$ se obțin soluțiile 7999, 9799 și 9997 **1p**

Problema 4. Într-o cutie se află 50 de cartonașe pe care sunt scrise primele 100 de numere naturale nenule, astfel: pe primul cartonaș sunt scrise numerele 1 (pe o parte) și 2 (pe cealaltă parte), pe al doilea cartonaș sunt scrise numerele 3 (pe o parte) și 4 (pe cealaltă parte) și așa mai departe, până la al 50-lea cartonaș, pe care sunt scrise numerele 99 (pe o parte) și 100 (pe cealaltă parte).

Eliza scoate patru cartonașe din cutie și calculează suma celor opt numere scrise pe ele. Câte sume distincte poate obține Eliza?

Soluție. Sumele celor două numere de pe fiecare cartonaș sunt: 3, 7, 11, 15, ..., 195, 199, adică numerele de forma $4k - 1$, unde k este un număr natural care ia valori între 1 și 50 **2p**

Dacă $4a - 1, 4b - 1, 4c - 1$ și $4d - 1$ sunt sumele de pe cele 4 cartonașe, suma totală este $4(a + b + c + d) - 4$, deci problema se reduce la a calcula numărul de valori pe care le poate lua suma a patru numere naturale nenule $a < b < c < d$, cuprinse între 1 și 50.

Suma minimă este $1 + 2 + 3 + 4 = 10$, iar suma maximă este $47 + 48 + 49 + 50 = 194$ **1p**

Vom arăta că fiecare sumă $a + b + c + d$ poate lua toate valorile de la 10 la 194, adică în total 185 de valori. Astfel avem:

- sumele de la 10 la 56 se obțin pentru $a = 1, b = 2, c = 3$ și d luând valori de la 4 la 50: $1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 5, 1 + 2 + 3 + 6, \dots, 1 + 2 + 3 + 50$

- sumele de la 57 la 102 se obțin pentru $a = 1, b = 2, d = 50$ și c luând valori de la 4 la 49: $1 + 2 + 4 + 50, 1 + 2 + 5 + 50, 1 + 2 + 6 + 50, \dots, 1 + 2 + 49 + 50$

• sumele de la 103 la 148 se obțin pentru $a = 1$, $c = 49$, $d = 50$ și b luând valori de la 3 la 48:
 $1 + 3 + 49 + 50$, $1 + 4 + 49 + 50$, $1 + 5 + 49 + 50$, ..., $1 + 48 + 49 + 50$

• sumele de la 149 la 194 se obțin pentru $b = 48$, $c = 49$, $d = 50$ și a luând valori de la 2 la 47:
 $2 + 48 + 49 + 50$, $3 + 48 + 49 + 50$, $4 + 48 + 49 + 50$, ..., $47 + 48 + 49 + 50$

În concluzie, Eliza poate obține 185 de sume diferite, și anume toate numerele cuprinse între $4 \cdot 10 - 4 = 36$ și $4 \cdot 194 - 4 = 772$, numărate din 4 în 4 **4p**