

**Examenul național de bacalaureat 2021**  
**Proba E. c)**

**Matematică M\_mate-info**

**Varianta 2**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică*  
*Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică*

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5p</b> | <b>1.</b> Arătați că $(1+i)^2 - 2(1+i) + 2 = 0$ , unde $i^2 = -1$ .   |
| <b>5p</b> | <b>2.</b> Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = x^2 + ax - 5$ , unde $a$ este număr real. Determinați numărul real $a$ , știind că punctul $M(1,2)$ aparține graficului funcției $f$ . |
| <b>5p</b> | <b>3.</b> Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_4(x^2 + 1) = \log_4 x + \log_4(x + 1)$ .  |
| <b>5p</b> | <b>4.</b> Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie divizibil cu 2 și cu 5.  |
| <b>5p</b> | <b>5.</b> În reperul cartezian $xOy$ se consideră punctele $M(3,4)$ , $N(0,1)$ și $P(3,0)$ . Determinați ecuația dreptei $d$ care trece prin punctul $P$ și este paralelă cu dreapta $MN$ .                             |
| <b>5p</b> | <b>6.</b> Se consideră triunghiul $ABC$ , dreptunghic în $C$ . Arătați că $\operatorname{tg} B = \frac{1}{\operatorname{tg} A}$ .   |

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5p</b> | <b>1.</b> Se consideră matricele $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $A(a) = \begin{pmatrix} a+2 & 0 & -a \\ 0 & 2 & 0 \\ 3a & 0 & 2-3a \end{pmatrix}$ , unde $a$ este număr real. |
| <b>5p</b> | <b>a)</b> Arătați că $\det(A(0)) = 8$ .   |
| <b>5p</b> | <b>b)</b> Determinați matricea $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ , știind că $aB = A(a) - 2I_3$ , pentru orice număr real $a$ .   |
| <b>5p</b> | <b>c)</b> Determinați numărul natural $n$ pentru care $\det(A(n) \cdot A(-n)) > 0$ .  |
| <b>5p</b> | <b>2.</b> Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă $x * y = \frac{1}{2}(x + y +  x - y )$ .  |
| <b>5p</b> | <b>a)</b> Arătați că $2 * 0 = 2$ .  |
| <b>5p</b> | <b>b)</b> Demonstrați că, dacă $a$ și $b$ sunt numere reale astfel încât $a \leq b$ , atunci $a * b = b$ .  |
| <b>5p</b> | <b>c)</b> Determinați numerele reale $x$ pentru care $(2x) * (x^2 + 1) * (-2x) = 10$ .  |

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5p</b> | <b>1.</b> Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = x - \sqrt{x^2 + 3}$ .    |
| <b>5p</b> | <b>a)</b> Arătați că $f'(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 3}}$ , $x \in \mathbb{R}$ .           |
| <b>5p</b> | <b>b)</b> Determinați ecuația asimptotei orizontale spre $+\infty$ la graficul funcției $f$ .             |
| <b>5p</b> | <b>c)</b> Determinați mulțimea valorilor reale ale lui $a$ pentru care ecuația $f(x) = a$ are soluție.    |
| <b>5p</b> | <b>2.</b> Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = \frac{x}{x^2 + x + 3}$ . |
| <b>5p</b> | <b>a)</b> Arătați că $\int_0^2 (x^2 + x + 3) f(x) dx = 2$ .   |

- 
- 5p** **b)** Arătați că  $\int_1^2 g(x)dx = \ln \frac{9}{5}$ , unde  $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(x) = \frac{2x+1}{x} \cdot f(x)$ .
- c)** Se consideră numerele reale  $a$  și  $b$ , cu  $0 \leq a < b$ . Pentru fiecare număr natural nenul  $n$ , se consideră numărul  $I_n = \int_a^b f^n(x)dx$ . Demonstrați că  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

**Examenul național de bacalaureat 2021**

**Proba E. c)**

**Matematică M\_mate-info**

**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 2**

*Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică*

*Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică*

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	$(1+i)^2 - 2(1+i) + 2 = 1 + 2i + i^2 - 2 - 2i + 2 =$ $= 1 - 1 = 0$	3p 2p
2.	$f(1) = 2 \Rightarrow 1 + a - 5 = 2$ $a = 6$	3p 2p
3.	$\log_4(x^2 + 1) = \log_4(x(x+1))$ , deci $x^2 + 1 = x^2 + x$ $x = 1$ , care convine	3p 2p
4.	Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri posibile În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 9 numere divizibile cu 2 și cu 5, deci sunt 9 cazuri favorabile $p = \frac{\text{nr. cazuri favorabile}}{\text{nr. cazuri posibile}} = \frac{9}{90} = \frac{1}{10}$	2p 2p 1p
5.	$m_{MN} = 1$ și, cum dreptele sunt paralele, obținem $m_d = 1$ $P \in d$ , deci ecuația dreptei $d$ este $y - y_P = m_d(x - x_P)$ , adică $y = x - 3$	3p 2p
6.	$\tg A = \frac{BC}{AC}$ $\tg B = \frac{AC}{BC} = \frac{1}{\frac{BC}{AC}} = \frac{1}{\tg A}$	2p 3p

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.a)	$A(0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(0)) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} =$ $= 8 + 0 + 0 - 0 - 0 - 0 = 8$	2p 3p
b)	$A(a) - 2I_3 = \begin{pmatrix} a+2 & 0 & -a \\ 0 & 2 & 0 \\ 3a & 0 & 2-3a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & -a \\ 0 & 0 & 0 \\ 3a & 0 & -3a \end{pmatrix}$ , pentru orice număr real $a$ $aB = a \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$ , pentru orice număr real $a$ , deci $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$	3p 2p
c)	$A(n) \cdot A(-n) = \begin{pmatrix} 4+2n^2 & 0 & -2n^2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 6n^2 & 0 & 4-6n^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(n) \cdot A(-n)) = 64(1-n^2)$ , unde $n$ este număr natural $64(1-n^2) > 0$ și, cum $n$ este număr natural, obținem $n=0$	3p 2p

<b>2.a)</b>	$2 * 0 = \frac{1}{2} (2 + 0 +  2 - 0 ) =$ $= \frac{1}{2} (2 + 2) = 2$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>b)</b>	$a \leq b \Rightarrow  a - b  = b - a$ $a * b = \frac{1}{2} (a + b +  a - b ) = \frac{1}{2} (a + b + b - a) = \frac{1}{2} \cdot 2b = b$ , pentru orice numere reale $a$ și $b$ astfel încât $a \leq b$	<b>2p</b>  <b>3p</b>
<b>c)</b>	$x^2 + 1 \geq 2x$ și $x^2 + 1 \geq -2x$ , pentru orice număr real $x$ , deci $((2x) * (x^2 + 1)) * (-2x) =$ $= (x^2 + 1) * (-2x) = (-2x) * (x^2 + 1) = x^2 + 1$ , pentru orice număr real $x$ $x^2 + 1 = 10$ , deci $x = -3$ sau $x = 3$	<b>3p</b>  <b>2p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**
**(30 de puncte)**

<b>1.a)</b>	$f'(x) = 1 - \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 3}} =$ $= 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3}} = \frac{\sqrt{x^2 + 3} - x}{\sqrt{x^2 + 3}}, \quad x \in \mathbb{R}$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( x - \sqrt{x^2 + 3} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - (x^2 + 3)}{x + \sqrt{x^2 + 3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{x + \sqrt{x^2 + 3}} = 0$ Dreapta de ecuație $y = 0$ este asymptota orizontală spre $+\infty$ la graficul funcției $f$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>c)</b>	$f'(x) > 0$ , pentru orice număr real $x$ , deci $f$ este strict crescătoare Cum $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ și $f$ este funcție continuă, ecuația $f(x) = a$ are soluție $\Leftrightarrow a \in (-\infty, 0)$	<b>2p</b>  <b>3p</b>
<b>2.a)</b>	$\int_0^2 (x^2 + x + 3) f(x) dx = \int_0^2 (x^2 + x + 3) \frac{x}{x^2 + x + 3} dx = \int_0^2 x dx = \frac{x^2}{2} \Big _0^2 =$ $= \frac{4}{2} = 2$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>b)</b>	$\int_1^2 g(x) dx = \int_1^2 \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx = \int_1^2 \frac{(x^2+x+3)'}{x^2+x+3} dx =$ $= \ln(x^2 + x + 3) \Big _1^2 = \ln 9 - \ln 5 = \ln \frac{9}{5}$	<b>3p</b>  <b>2p</b>
<b>c)</b>	$0 \leq \frac{x}{x^2 + x + 3} \leq \frac{1}{2}$ , pentru orice $x \in [0, +\infty)$ , deci $0 \leq f^n(x) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$ , pentru orice $x \in [0, +\infty)$ și orice număr natural nenul $n$ $0 \leq I_n = \int_a^b f^n(x) dx \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (b - a)$ , pentru orice număr natural nenul $n$ și, cum $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ , obținem că $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$	<b>2p</b>  <b>3p</b>