

**Examenul național de bacalaureat 2023**

**Proba E. c)**

**Matematică M\_pedagogic**

**Varianta 7**

*Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educator*

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>5p</b> | 1. Arătați că $\sqrt{50} - 5(\sqrt{2} - 1) = 5$ .  |
| <b>5p</b> | 2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , $f(x) = x^2 - 3x + a$ , unde $a$ este număr real. Arătați că $f(1) = f(2)$ , pentru orice număr real $a$ .                              |
| <b>5p</b> | 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_3(x+2) = \log_3(4-x)$ .   |
| <b>5p</b> | 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de două cifre, acesta să aibă produsul cifrelor egal cu 8.  |
| <b>5p</b> | 5. În reperul cartezian $xOy$ se consideră punctele $A(3, a)$ , $B(1, 0)$ și $C(5, 2)$ , unde $a$ este număr real. Determinați numărul real $a$ , știind că punctul $A$ este mijlocul segmentului $BC$ . |
| <b>5p</b> | 6. Arătați că $\sin 30^\circ + \sqrt{2} \cos 45^\circ + \cos 60^\circ = 2$ .   |

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>5p</b> | Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă $x * y = 3(4 - x - y) + xy$ .   |
| <b>5p</b> | 1. Arătați că $3 * 0 = 3$ .   |
| <b>5p</b> | 2. Demonstrați că $x * y = (x - 3)(y - 3) + 3$ , pentru orice numere reale $x$ și $y$ .                 |
| <b>5p</b> | 3. Arătați că $e = 4$ este elementul neutru al legii de compoziție „ $*$ ”.                             |
| <b>5p</b> | 4. Arătați că $\frac{7}{3}$ este simetricul lui $\frac{3}{2}$ în raport cu legea de compoziție „ $*$ ”. |
| <b>5p</b> | 5. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $9^x * 3^x = 3$ .                                      |
| <b>5p</b> | 6. Calculați $3 * 4 * 5 * \dots * 2023$ .   |

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

- |           |  |
|-----------|--|
| <b>5p</b> | Se consideră matricele $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ , $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B(a) = \begin{pmatrix} a+2 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ , unde $a$ este număr real. |
| <b>5p</b> | 1. Arătați că $\det(B(0)) = -1$ .  |
| <b>5p</b> | 2. Arătați că $A \cdot A = 5I_2$ .   |
| <b>5p</b> | 3. Determinați numerele reale $a$ pentru care $\det(B(a) + A) = 0$ .   |
| <b>5p</b> | 4. Determinați numărul real $a$ pentru care $B(a) \cdot B(-2) = B(0) - I_2$ .  |
| <b>5p</b> | 5. Demonstrați că matricea $B(a-1)$ este inversabilă, pentru orice număr rațional $a$ .  |
| <b>5p</b> | 6. Determinați matricea $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , știind că $X \cdot B(0) = A$ .   |

**Examenul național de bacalaureat 2023**  
**Proba E. c)**

**Matematică M\_pedagogic**  
**BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE**

**Varianta 7**

*Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare*

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1.	$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ , $5(\sqrt{2} - 1) = 5\sqrt{2} - 5$ $5\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 5 = 5$	<b>3p</b> <b>2p</b>
2.	$f(1) = a - 2$ , pentru orice număr real $a$ $f(2) = a - 2$ , deci $f(1) = f(2)$ , pentru orice număr real $a$	<b>2p</b> <b>3p</b>
3.	$x + 2 = 4 - x$ $x = 1$ , care convine	<b>2p</b> <b>3p</b>
4.	Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri posibile În mulțimea numerelor naturale de două cifre, numerele care au produsul cifrelor egal cu 8 sunt: 18, 24, 42 și 81, deci sunt 4 cazuri favorabile, de unde obținem $p = \frac{4}{90} = \frac{2}{45}$	<b>2p</b> <b>3p</b>
5.	$a = \frac{0+2}{2}$ $a = 1$	<b>3p</b> <b>2p</b>
6.	$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ , $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ , $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ $\frac{1}{2} + \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} = 2$	<b>3p</b> <b>2p</b>

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1.	$3 * 0 = 3(4 - 3 - 0) + 3 \cdot 0 =$ $= 3 \cdot 1 + 0 = 3$	<b>3p</b> <b>2p</b>
2.	$x * y = xy - 3x - 3y + 9 + 3 =$ $= x(y - 3) - 3(y - 3) + 3 = (x - 3)(y - 3) + 3$ , pentru orice numere reale $x$ și $y$	<b>2p</b> <b>3p</b>
3.	$x * 4 = (x - 3)(4 - 3) + 3 = x$ , pentru orice număr real $x$ $4 * x = (4 - 3)(x - 3) + 3 = x$ , pentru orice număr real $x$ , deci $e = 4$ este elementul neutru al legii de compoziție „*”	<b>2p</b> <b>3p</b>
4.	$\frac{7}{3} * \frac{3}{2} = \left(\frac{7}{3} - 3\right)\left(\frac{3}{2} - 3\right) + 3 = 4$ $\frac{3}{2} * \frac{7}{3} = \left(\frac{3}{2} - 3\right)\left(\frac{7}{3} - 3\right) + 3 = 4$ , deci $\frac{7}{3}$ este simetricul lui $\frac{3}{2}$ în raport cu legea de compoziție „*”	<b>2p</b> <b>3p</b>
5.	$9^x * 3^x = (9^x - 3)(3^x - 3) + 3$ , pentru orice număr real $x$ $(3^{2x} - 3)(3^x - 3) = 0$ , de unde obținem $x = \frac{1}{2}$ sau $x = 1$	<b>2p</b> <b>3p</b>
6.	$3 * x = 3$ , pentru orice număr real $x$ $3 * 4 * 5 * \dots * 2023 = 3 * (4 * 5 * \dots * 2023) = 3$	<b>2p</b> <b>3p</b>

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

<b>1.</b> $\det(B(0)) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 =$ $= 0 - 1 = -1$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>2.</b> $A \cdot A = \begin{pmatrix} 1+4 & -2+2 \\ -2+2 & 4+1 \end{pmatrix} =$ $= \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_2$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>3.</b> $\det(B(a) + A) = \begin{vmatrix} a+1 & 3 \\ 3 & a+1 \end{vmatrix} = (a+1)^2 - 3^2$ $a = 2 \text{ sau } a = -4$	<b>3p</b> <b>2p</b>
<b>4.</b> $B(a) \cdot B(-2) = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1-2a \end{pmatrix}, \text{ pentru orice număr real } a$ Cum $B(0) - I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ , obținem $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1-2a \end{pmatrix} \Leftrightarrow a = 1$	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>5.</b> $\det(B(a-1)) = \begin{vmatrix} a+1 & 1 \\ 1 & a-1 \end{vmatrix} = a^2 - 2, \text{ pentru orice număr real } a$ Cum $a$ este număr rațional, obținem $a^2 - 2 \neq 0$ , deci matricea $B(a-1)$ este inversabilă	<b>2p</b> <b>3p</b>
<b>6.</b> Inversa matricei $B(0)$ este matricea $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	<b>2p</b> <b>3p</b>