

Examenul național de bacalaureat 2027

Proba E. c)

Matematică *M_pedagogic*

Model

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de trei ore.



SUBIECTUL I

(30 de puncte)

- 5p 1. Determinați suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice $(a_n)_{n \geq 1}$, în care $a_3 = 14$ și $a_4 = 19$.
- 5p 2. Se consideră funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = 5x - 6$. Determinați numărul real a pentru care punctul $A(a, 4)$ aparține graficului funcției f .
- 5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația $\log_{\frac{1}{2}}(x+1) = -2$.
- 5p 4. După două scumpiri succesive cu câte 10% fiecare, prețul unui obiect este de 484 de lei. Determinați prețul obiectului înainte de cele două scumpiri.
- 5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul $A(-1, 3)$ și dreapta d de ecuație $y = x + 3$. Determinați ecuația dreptei care trece prin punctul A și este paralelă cu dreapta d .
- 5p 6. Se consideră triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu $BC = 2\sqrt{10}$ și $\operatorname{tg} C = \frac{1}{3}$. Arătați că aria triunghiului ABC este egală cu 6.

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

- Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție $x * y = xy + 6x + 6y + 30$.
- 5p 1. Arătați că $(-1) * 2 = 34$.
- 5p 2. Determinați numărul real x pentru care $x * (-3) = 0$.
- 5p 3. Arătați că $e = -5$ este elementul neutru al legii de compoziție „*”.
- 5p 4. Determinați numărul real a pentru care $x * y = (x + 6)(y + 6) + a$, pentru orice numere reale x și y .
- 5p 5. Determinați mulțimea numerelor reale x pentru care $x * (x - 5) \leq x$.
- 5p 6. Determinați numerele naturale nenule n pentru care $N = n * \frac{2}{n}$ este număr natural impar.

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- Se consideră matricea $A(a) = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 2a & 0 \end{pmatrix}$, unde a este număr real.
- 5p 1. Arătați că $\det(A(3)) = 18$.
- 5p 2. Determinați numărul real a pentru care $A(-3) + 2A(3) = 3A(a)$.
- 5p 3. Arătați că matricea $A(a)$ este inversabilă, pentru orice număr real nenul a .
- 5p 4. Calculați $\det X$, unde $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, astfel încât $X + A(1) = A(5) - X$.
- 5p 5. Demonstrați că, dacă a , b și c sunt numere reale astfel încât $A(0) \cdot A(a) + A(b) \cdot A(0) = 2A(c)$, atunci $a = b = 2c$.
- 5p 6. Determinați numerele reale nenule a pentru care $A(a) + (A(a))^{-1} = I_2$, unde $(A(a))^{-1}$ este inversa matricei $A(a)$ și $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Examenul național de bacalaureat 2027

Proba E. c)

Matematică $M_{pedagogic}$

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Model

Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare

- Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
- Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele punctajului indicat în barem.
- Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat pentru lucrare.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.	$r = a_4 - a_3 = 5$, unde r este rația progresiei aritmetice $a_1 = 4$, deci $a_1 + a_2 + a_3 = 27$	3p 2p
2.	$f(a) = 4$, de unde obținem $5a - 6 = 4$ $a = 2$	3p 2p
3.	$x + 1 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$, deci $x + 1 = 4$ $x = 3$, care convine	3p 2p
4.	Prețul după prima scumpire este $x + \frac{10}{100} \cdot x = \frac{11x}{10}$, unde x este prețul înainte de cele două scumpiri Prețul obiectului după a doua scumpire este $\frac{11x}{10} + \frac{10}{100} \cdot \frac{11x}{10} = \frac{121x}{100}$, deci $\frac{121x}{100} = 484$, de unde obținem $x = 400$ de lei	3p 2p
5.	Panta dreptei d este $m = 1$ Ecuația dreptei care trece prin punctul $A(x_A, y_A)$ și este paralelă cu dreapta d este $y - y_A = m(x - x_A)$, deci $y = x + 4$	2p 3p
6.	$\frac{1}{3} = \frac{AB}{AC}$, deci $AC = 3AB$ $AB = 2$, $AC = 6$, deci $\mathcal{A}_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot AC}{2} = 6$	2p 3p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1.	$(-1) * 2 = (-1) \cdot 2 + 6 \cdot (-1) + 6 \cdot 2 + 30 =$ $= -2 - 6 + 12 + 30 = 34$	3p 2p
2.	$x * (-3) = 3x + 12$, pentru orice număr real x $3x + 12 = 0$, de unde obținem $x = -4$	3p 2p
3.	$x * (-5) = -5x + 6x - 30 + 30 = x$, pentru orice număr real x $(-5) * x = -5x - 30 + 6x + 30 = x$, pentru orice număr real x , deci $e = -5$ este elementul neutru al legii de compoziție „ $*$ ”	2p 3p
4.	$x * y = xy + 6x + 6y + 36 - 6 = x(y + 6) + 6(y + 6) - 6 =$ $= (x + 6)(y + 6) - 6$, deci $(x + 6)(y + 6) + a = (x + 6)(y + 6) - 6$, pentru orice numere reale x și y , de unde obținem $a = -6$	3p 2p
5.	$x * (x - 5) = x^2 + 7x$, pentru orice număr real x $x^2 + 7x \leq x$, deci $x^2 + 6x \leq 0$, de unde obținem $x \in [-6, 0]$	2p 3p

6.	$N = 32 + 6n + \frac{12}{n}$, pentru orice număr natural nenul n	3p
	Cum n este număr natural nenul și $N = 2(16 + 3n) + \frac{12}{n}$ este număr natural impar, obținem $n = 4$ și $n = 12$	2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.	$A(3) = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A(3)) = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 0 - (-3) \cdot 6 =$	3p
	$= 0 + 18 = 18$	2p
2.	$A(-3) + 2A(3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -6 \\ 12 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 3A(1)$	3p
	$3A(1) = 3A(a)$, de unde obținem $a = 1$	2p
3.	$\det(A(a)) = 2a^2$, pentru orice număr real a	3p
	Pentru orice număr real nenul a , $\det(A(a)) \neq 0$, deci matricea $A(a)$ este inversabilă	2p
4.	$X = \frac{1}{2}(A(5) - A(1))$, $A(5) - A(1) = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$	3p
	$X = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$, deci $\det X = 8$	2p
5.	$A(0) \cdot A(a) = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A(b) \cdot A(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2b & 0 \end{pmatrix}$, $A(0) \cdot A(a) + A(b) \cdot A(0) = \begin{pmatrix} 2 & -a \\ 2b & 0 \end{pmatrix}$, pentru orice numere reale a și b	3p
	$\begin{pmatrix} 2 & -a \\ 2b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2c \\ 4c & 0 \end{pmatrix}$, de unde obținem $a = b = 2c$	2p
6.	Cum $A(a)$ este inversabilă pentru orice număr real nenul a , obținem $A(a) \cdot A(a) + I_2 = A(a)$	2p
	$\begin{pmatrix} 2 - 2a^2 & -a \\ 2a & 1 - 2a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ 2a & 0 \end{pmatrix}$, de unde obținem $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ sau $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, care convin	3p